

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — asciminib (as-KIM-uh-nib)

Nombre de marca — SCEMBLIX®

Usos comunes

Asciminib se usa para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC).

Asciminib también se puede usar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar asciminib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de asciminib es:
 - 80 miligramos (80 mg) tomados por boca a una hora programada una vez al día

0

 - 40 miligramos (40 mg) tomados por boca a una hora programada dos veces al día, separados por aproximadamente 12 horas

0

 - 200 miligramos (200 mg) tomados por boca a una hora programada dos veces al día, separados por aproximadamente 12 horas**
- ** Los efectos secundarios de asciminib varían con una dosis más alta (200 mg dos veces al día).
- Asciminib se debe tomar sin comida, a la misma hora cada día. No coma por al menos 2 horas antes y 1 hora después de tomar asciminib.
- Asciminib se debe tomar entero y no triturado, cortado o disuelto. Si usted tiene dificultad para tragar asciminib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de asciminib:
 - Para la dosis de una vez al día: solo tome la dosis omitida si han pasado menos de 12 horas desde que debía tomarla. Luego, tome la siguiente dosis en el horario regularmente programado.
 - Para la dosis de dos veces al día: solo tome la dosis omitida si han pasado menos de 6 horas desde que debía tomarla. Luego, tome la siguiente dosis en el horario regularmente programado.
 - No tome dos dosis al mismo tiempo.
 - Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Interacciones con medicamentos y alimentos

- ❑ Asciminib tiene muchas interacciones con otros medicamentos; por favor informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- ❑ La toronja o jugo de toronja podría interactuar con asciminib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- ❑ Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

Almacenamiento y manejo

Maneje asciminib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- ❑ Guarde asciminib a temperatura ambiente (68 a 77 F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- ❑ Mantenga asciminib lejos del alcance de niños y mascotas.
- ❑ Deje asciminib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- ❑ Cuando sea posible, administre asciminib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra Asciminib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera asciminib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Qítense los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
 8. No se recomienda el uso de un organizador diario o recordatorio para su medicamento.
- ❑ **NO se recomienda** usar un organizador de medicamentos o recordatorio con asciminib.
- ❑ Si le queda asciminib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar asciminib apropiadamente.
- ❑ Si estará viajando, coloque el envase de asciminib en un bolso plástico sellado separado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Efectos Secundarios de Asciminib**

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman avapritinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor.

**Los efectos secundarios de asciminib varían con una dosis más alta (200 mg dos veces al día).

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado</p>	<p>Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras. • Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz. • Cepille sus dientes con cuidado, con un cepillo suave y mantenga una buena higiene oral. • Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas. • Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas. <p>Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión. • Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión. • Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes. <p>Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable.</p> <p>Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.</p>
<p>Disminución de glóbulos blancos y aumento en el riesgo de infecciones</p>	<p>Sus glóbulos blancos serán monitoreados a través de pruebas simples de sangre. Cuando los glóbulos blancos están bajos, usted tiene un mayor riesgo a desarrollar una infección. Tome las siguientes precauciones para protegerse de una infección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lave sus manos a menudo, especialmente antes de comer y después de usar el baño. • Evite las multitudes y las personas con fiebre, influenza, u otra infección. • Báñese regularmente para mantener una buena higiene personal. <p>Contacte a su proveedor de salud si presenta alguna señal o síntoma de una infección, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (temperatura de más de 100.4F o 38C) • Escalofríos • Dolor o molestia en la garganta • Ardor al orinar • Cansancio inusual • Una herida que se enrojece, que está drenando, o que no sana <p>Consulte con su médico antes de tomar un medicamento para la fiebre o escalofríos.</p>

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trate de dormir 7-8 horas cada noche. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio. • Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”. • Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite. • Note si se ve más pálido o pálida de lo usual. <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Mareos • Palpitaciones
<p>Dolor muscular o en las articulaciones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga un diario de su dolor, incluyendo una descripción de cuándo y dónde ocurre el dolor, cómo se siente y cuánto tiempo dura. • Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse de ser necesario. • Dígale a su proveedor de salud si el dolor le interrumpe sus actividades diarias. <p>Si el dolor le molesta, pregunte a su proveedor de salud qué puede usar para ayudar con la molestia. Solamente tome medicamentos para el dolor que sean recetados o recomendados por su proveedor de salud.</p>
<p>Fatiga</p>	<p>Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita. • Intente realizar actividades físicas todos los días. • Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.
<p>Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio incluyendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alta creatina quinasa • Aumento del colesterol 	<p>Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre. Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolores musculares sin explicación



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Efectos secundarios severos

- La supresión de la médula ósea es una disminución del número de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas que puede ser grave con asciminib. Hable con su proveedor de salud para saber cuándo necesita hacerse pruebas de laboratorio para monitorear su número de células sanguíneas. También es posible que necesite detener su medicamento para procedimientos médicos o dentales. Hable con su proveedor de salud o dentista antes de cualquier procedimiento.
- Asciminib puede ser dañino para el páncreas. Busque atención médica si tiene dolor o sensibilidad estomacal intensa, fiebre o vómitos.
- Puede tener la presión sanguínea elevada mientras tome asciminib. Tómese la presión sanguínea regularmente y notifique a su equipo de cuidado sobre cualquier aumento significativo de la misma.
- Las reacciones alérgicas graves son un efecto secundario raro pero serio de asciminib. Busque atención médica de inmediato si nota dificultad para respirar, hinchazón de la boca o la lengua, o un sarpullido grave.
- Asciminib puede causar toxicidad cardiovascular, es decir, daños en el músculo cardíaco y/o en los vasos sanguíneos. Busque atención médica de inmediato si siente dolor o presión en el pecho.
- Asciminib puede causar una condición llamada prolongación QT o QTc que es un ritmo cardíaco que puede causar latidos del corazón rápidos e irregulares. Estos latidos rápidos pueden provocar desmayos o convulsiones. En raras ocasiones, esto puede poner en peligro su vida. Informe inmediatamente a su equipo de atención si se siente débil, aturdido, mareado o si nota que su corazón late de forma irregular o rápida mientras toma asciminib.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.:

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que asciminib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, este puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar asciminib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento Asciminib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman asciminib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 1 semana después de la última dosis de asciminib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma asciminib y por 1 semana después de la última dosis de asciminib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma Asciminib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre el proceso para obtener su asciminib.

_____ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.us.scemblix.com>

Información de prescripción del producto: <https://www.novartis.us/sites/www.novartis.us/files/scemblix.pdf>

Recursos del producto: <https://www.novartis.com/patients-and-caregivers>

Actualizado – Junio 12, 2023

Instrucciones adicionales



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ASCIMINIB

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.