

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



DABRAFENIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — dabrafenib (duh-BRA-feh-nib)

Nombre de marca — Tafinlar® (TA-fin-lar)

Usos comunes

Dabrafenib se usa para tratar pacientes con:

- Melanoma que tiene una variación genética llamada BRAF V600E o V600K y puede ser utilizada en combinación con trametinib
- Cáncer de pulmón de células no pequeñas que tiene una variación genética llamada BRAF V600E y puede ser utilizada en combinación con trametinib
- Cáncer anaplásico de tiroides que tiene una variación genética llamada BRAF V600E y puede ser utilizada en combinación con trametinib
- Tumores sólidos irresecables o metastáticos que tienen una variación genética llamada BRAF V600E y puede ser utilizada en combinación con trametinib
- Glioma de bajo grado en pacientes pediátricos de 1 año de edad o más que tienen una variación genética llamada BRAF V600E y puede ser utilizada en combinación con trametinib

Dabrafenib también se puede usar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar dabrafenib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de dabrafenib es 150 miligramos (mg) a ser tomados por boca a una hora programada dos veces al día.
- Dabrafenib se debe tomar con el estómago vacío (una hora antes o dos horas después de una comida o merienda) y a la misma hora cada día, dos veces al día.
- Dabrafenib se debe tomar entero y no triturado, cortado o disuelto. Si usted tiene dificultad para tragar dabrafenib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de dabrafenib:
 - Tome la dosis olvidada si solo han pasado menos de seis horas desde que se suponía que lo tomara. Luego, tome la próxima dosis a la hora regularmente programada.
 - **No** tome dos dosis a la misma vez.
 - Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



DABRAFENIB

Interacciones con medicamentos y alimentos

- ❑ Dabrafenib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- ❑ La toronja o jugo de toronja podría interactuar con dabrafenib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- ❑ Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

Almacenamiento y manejo

Maneje dabrafenib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- ❑ Guarde dabrafenib a temperatura ambiente (68°F-77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- ❑ Mantenga dabrafenib lejos del alcance de niños y mascotas.
- ❑ Deje dabrafenib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- ❑ Cuando sea posible, administre dabrafenib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra dabrafenib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera dabrafenib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- ❑ Si utilizará un organizador diario o recordatorio para dabrafenib, contacte a su equipo de cuidado antes de utilizarlo:
 - La persona que llena el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio).
 - Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
- ❑ Si le queda dabrafenib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar dabrafenib apropiadamente.
- ❑ Si estará viajando, coloque el envase de dabrafenib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



DABRAFENIB

Efectos Secundarios de Dabrafenib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman dabrafenib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

| Posible Efecto Secundario | Manejo |
|--|--|
| Engrosamiento de la piel (hiperqueratosis) | Pregunte a su proveedor de salud por estrategias para manejar este síntoma, si le molesta. |
| Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio <ul style="list-style-type: none"> • Altos niveles de glucosa • Bajos niveles de fosfato | Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre. <ul style="list-style-type: none"> • Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio. • Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio. Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Molestias en el pecho • Debilidad o fatiga • Nuevos dolores o molestias • Dolor de cabeza • Mareos • Hinchazón de las piernas o los pies • Orina de color rojo o marrón |
| Dolor de cabeza | Pregunte a su proveedor de salud qué puede utilizar para ayudar con esta molestia. Contacte a su proveedor de salud inmediatamente si su dolor de cabeza: <ul style="list-style-type: none"> • Le sigue a una lesión en la cabeza • Es severo o comienza repentinamente • No mejora después de 3 días • Está asociado con vómitos, cambios visuales, rigidez en el cuello, somnolencia, confusión, si empeora al toser o al bajar la cabeza, sarpullido, debilidad en un brazo o pierna, o adormecimiento. |
| Fiebre | Puede que se sienta caliente, frialdad y escalofríos, adolorido o mareado. Esto usualmente sucede durante el primer mes del tratamiento, pero podría ocurrir en cualquier momento. <ul style="list-style-type: none"> • Llame a su doctor inmediatamente si usted tiene una fiebre de 100.4oF • Pregunte a su doctor si puede tomar algún medicamento para aliviar la fiebre. |

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



DABRAFENIB

| Posible Efecto Secundario | Manejo |
|--|---|
| Dolor muscular o en las articulaciones, o debilidad | <ul style="list-style-type: none">• Mantenga un diario de su dolor, incluyendo una descripción de cuándo y dónde ocurre el dolor, cómo se siente y cuánto tiempo dura.• Manténgase lo más activo o activa posible, pero descance de ser necesario.• Dígale a su proveedor de salud si el dolor le interrumpe sus actividades diarias. <p>Si el dolor o la debilidad le molesta, pregunte a su proveedor de salud qué puede usar para ayudar con la molestia. Solamente tome medicamentos para el dolor que sean recetados o recomendados por su proveedor de salud.</p> |

Efectos secundarios severos de dabrafenib

- ❑ Una malignidad secundaria es el crecimiento de un cáncer meses o años luego del tratamiento. Este es un efecto secundario raro pero posible del tratamiento con dabrafenib.
- ❑ Dabrafenib puede ser dañino para sus ojos. Asegúrese de informarle a su proveedor de salud sobre cualquier problema que tenga con su visión, o dolor en sus ojos. Su proveedor puede detener el tratamiento con dabrafenib si sus ojos están afectados.
- ❑ Fiebres graves pueden ocurrir cuando dabrafenib se utiliza con trametinib.
- ❑ Si usted tiene una deficiencia de G6PD, dabrafenib puede aumentar su riesgo de anemia hemolítica. Comuníquese con su equipo de cuidado si usted experimenta debilidad, mareos, piel u ojos amarillentos, u orina oscura o marrón.
- ❑ Dabrafenib puede hacer que su corazón trabaje más fuerte para bombear la sangre al resto de su cuerpo. Notifique a su equipo de cuidado si está teniendo dificultad para respirar o dolor de pecho.
- ❑ Usted puede tener mayor riesgo de sangrados mientras toma dabrafenib. Comuníquese con su equipo de cuidado si nota sangrados por la nariz frecuentemente, sangre en sus heces, sangrado que ocurre por sí solo sin lesión, o sangrado que no se detiene luego de 5 minutos de presión.
- ❑ Sus niveles de azúcar en la sangre pueden ser más altos mientras toma dabrafenib. Su proveedor de cuidado podrá pedirle que verifique sus niveles de azúcar en la sangre regularmente. Comuníquese con su equipo de cuidado si está orinando más de lo normal, está muy sediento, más cansado de lo normal, o tiene problemas manteniendo sus niveles de azúcar en la sangre dentro del rango deseado.
- ❑ Raramente, dabrafenib puede causar reacciones severas en la piel, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, el cual puede ser potencialmente mortal. Busque atención de emergencia si tiene un sarpullido severo o sarpullido en su boca, ojos, o genitales.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



DABRAFENIB

Manejo de fluidos corporales y desechos

Dabrafenib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, por lo que el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento dabrafenib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Los hombres y mujeres con potencial y edad fértil deben usar anticoncepción no hormonal efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de **2 semanas** después de la última dosis de dabrafenib. **Dabrafenib puede hacer que los anticonceptivos hormonales sean inefectivos.**
- No amamante mientras toma dabrafenib y por 2 semanas después de la última dosis de dabrafenib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma dabrafenib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su dabrafenib.

_____ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



DABRAFENIB

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.us.tafinlarmekinist.com>

Información de prescripción del producto: <https://www.novartis.us/sites/www.novartis.us/files/tafinlar.pdf>

Recursos del producto: <https://www.us.tafinlarmekinist.com/advanced-melanoma/patient-support/patient-resources>

Actualizado — Junio 1, 2023

Instrucciones adicionales

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.