

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — dasatinib (da-SA-tih-nib)

Nombre de marca — Sprycel® (SPRY-sel)

### Usos aprobados

Dasatinib se usa para tratar leucemia mieloide crónica (CML) en niños y adultos que tienen el cromosoma Philadelphia-positiva (Ph+). Dasatinib también se usa para leucemia linfoblástica aguda con Ph+.

### Administración y dosis

Para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, es importante que se tome su dasatinib como se le ha instruido. Por esto, lea unos puntos claves que debe recordar:

- Su dosis puede que varíe, pero la dosis usual es de 100 miligramos (mg) a 140 miligramos (mg), una vez al día a la misma hora por vía oral. Las dosis para niños son basadas en el peso corporal.
- Se puede tomar su dasatinib con o sin comida, pero siempre a la misma hora.
- La pastilla de dasatinib se debe tomar entera; no la triture, corte o disuelva. Si tiene dificultad para tragar, por favor consulte con su equipo de salud o farmacéutico para otras posibles opciones
- Si se le olvida una dosis de dasatinib, **no** se tome una dosis adicional ni se tome dos dosis al mismo tiempo. Simplemente tome su próxima dosis a la hora que le toca.
- Asegúrese de documentar y decirle a su equipo médico de las dosis que olvidó tomar.

### Interacciones con alimentos y otros medicamentos

- Dasatinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Infórmele a su equipo médico de todos los medicamentos con receta y sin receta, suplementos, productos herbales y antiácidos que esté tomando.
- La toronja o jugo de toronja puede interactuar con su dasatinib; evite el consumo de estos durante su tratamiento con dasatinib.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento o suplemento nuevo, o antes de recibir una vacuna.
- Dasatinib contiene 135mg de lactosa monohidratado en la dosis de 100mg diaria y 189mg de lactosa monohidratado en la dosis de 140mg diaria. Notifique a su proveedor de salud si usted es intolerante a la lactosa.

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

### Almacenamiento y manejo

Maneje dasatinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición con otros medicamentos debe ser limitada.

- Guarde su dasatinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga dasatinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Mantenga dasatinib en su empaque original, hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, administre Dasatinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra Dasatinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
  1. Lávese las manos con jabón y agua.
  2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera dasatinib de su empaque original a un vasito pequeño de medicina u otro vasito desechable.
  4. Administre el medicamento inmediatamente con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
  6. Tire los guantes y el vasito de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si usted utilizará un contenedor de medicamentos diario o recordatorio, contacte a su equipo de salud antes de utilizarlo:
  - La persona que llenará el contenedor diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el contenedor o recordatorio).
  - Cuando esté vacío, el contenedor diario debe lavarse con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el contenedor, aunque haya utilizado guantes.
- Si le queda dasatinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y no lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar dasatinib apropiadamente.
- Cuando esté viajando, coloque su dasatinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones adicionales al viajar.

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

### Efectos Secundarios de Dasatinib

Abajo encontrará efectos secundarios comunes que suceden en uno de tres pacientes o más que toman dasatinib, en el lado izquierdo de la tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado</b></p>	<p>Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras.</li> <li>• Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz.</li> <li>• Cepílese los dientes con cuidado, con un cepillo de dientes suave y mantenga una buena higiene oral.</li> <li>• Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas.</li> <li>• Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas.</li> </ul> <p>Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes.</li> </ul> <p>Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable.</p> <p><b>Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.</b></p>
<p><b>Dolor de cabeza</b></p>	<p>Pregunte a su proveedor de salud qué puede utilizar para ayudar con esta molestia. Contacte a su proveedor de salud inmediatamente si su dolor de cabeza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es a causa de una lesión en la cabeza</li> <li>• Es severo o comienza repentinamente</li> <li>• No mejora después de 3 días</li> <li>• Está asociado con vómitos, cambios visuales, rigidez en el cuello, somnolencia, confusión, si empeora al toser o al bajar la cabeza, sarpullido, debilidad en un brazo o pierna, o adormecimiento.</li> </ul>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Disminución de glóbulos blancos y aumento en el riesgo de infecciones</b></p>	<p>Sus glóbulos blancos serán monitoreados a través de pruebas simples de sangre. Cuando los glóbulos blancos están bajos, usted tiene un mayor riesgo mayor a desarrollar una infección. Tome las siguientes precauciones para protegerse de una infección:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lávese las manos frecuentemente, especialmente antes de comer y después de usar el baño.</li> <li>• Evite las multitudes y las personas con fiebre, influenza, u otra infección.</li> <li>• Báñese regularmente para mantener una buena higiene personal.</li> </ul> <p>Contacte a su proveedor de salud si presenta alguna señal o síntoma de una infección, como las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre (temperatura de más de 100.4F o 38C)</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Dolor o molestia en la garganta</li> <li>• Ardor al orinar</li> <li>• Cansancio inusual</li> <li>• Una herida que se enrojece, que está drenando, o que no sana</li> </ul> <p>Consulte con su proveedor de salud antes de tomar cualquier medicamento para la fiebre o escalofríos.</p>
<p><b>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</b></p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trate de dormir 7-8 horas cada noche.</li> <li>• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.</li> <li>• Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”.</li> <li>• Manténgase lo más activo o activa posible, pero entienda que también está bien descansar cuando lo necesite.</li> <li>• Note si se ve más pálido o pálida de lo usual.</li> </ul> <p>Déjele saber a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Mareos</li> <li>• Palpitaciones</li> </ul>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Retención de fluido o hinchazón</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se mantenga de pie por períodos largos de tiempo.</li> <li>Mantenga sus piernas elevadas mientras esté sentado o acostado.</li> <li>Evite las comidas saladas, ya que estas pueden aumentar la hinchazón.</li> <li>Evite usar ropa apretada y zapatos apretados.</li> </ul>
<b>Dolor de cabeza</b>	<p>Pregunte a su proveedor de salud qué puede utilizar para ayudar con esta molestia. Contacte a su proveedor de salud inmediatamente si su dolor de cabeza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es a causa de una lesión en la cabeza</li> <li>Es severo o comienza repentinamente</li> <li>No mejora después de 3 días</li> </ul>
<b>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</b>	<p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li> <li>Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de unas pocas comidas más grandes.</li> <li>Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas)</li> <li>Evite los alimentos ricos en fibra, como los vegetales crudos, las frutas crudas y cereales integrales.</li> <li>Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles.</li> <li>Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche.</li> <li>Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li> </ul> <p>Comuníquese con su proveedor de salud si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más.</li> <li>Se siente mareado o aturdido.</li> </ul> <p>Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica) llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con su diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.</p>
<b>Dolor muscular, dolor en las articulaciones, debilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga un diario de su dolor, incluyendo una descripción de cuándo y dónde ocurre el dolor, cómo se siente y cuánto tiempo dura.</li> <li>Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse de ser necesario.</li> <li>Dígale a su proveedor de salud si el dolor (o los espasmos) le interrumpe sus actividades diarias.</li> </ul> <p>Si el dolor, la debilidad (o los espasmos) le molesta, pregunte a su proveedor de salud qué puede utilizar para ayudarlo con esta molestia. Solo tome medicamentos para el dolor que le recete o recomiende su proveedor de salud.</p>

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

### Efectos secundarios severos de dasatinib

- ❑ Solicite atención médica urgente se siente dolor o apretazón en el pecho, que el corazón le late rápidamente, pérdida de consciencia, dificultad al respirar, cambios en la visión, o en el habla.
- ❑ Dasatinib puede causar un sarpullido severo. Dígame a su doctor si tiene alguna preocupación con su piel. El tratamiento podría detenerse si alguna reacción ocurre en la piel.
- ❑ El crecimiento y desarrollo debe ser monitoreado si un niño está tomando dasatinib.
- ❑ Algunos pacientes han presentado el síndrome de lisis tumoral (TLS) cuando comienza el tratamiento con dasatinib. TLS es una condición que ocurre cuando muchas células cancerígenas mueren rápido y liberan su contenido en la sangre, el cual puede dañar sus riñones y otras partes del cuerpo. Su proveedor medico puede recetarle un medicamento o mandarle hacer una prueba de sangre de ser necesario.
- ❑ Dasatinib puede causar una condición cardiaca que se llama QT o elongación del segmento QTc que indica que su ritmo cardiaco esta rápido e irregular. Estos latidos rápidos pueden causar desmayos o convulsiones. En raros casos, esto puede ser una condición crítica que pone en peligro su vida. Dígame a su equipo médico rápidamente si se siente mareado, débil, aturdido, o si los latidos de su corazón están rápidos o irregulares mientras está tomando dasatinib.
- ❑ Dasatinib puede causar presión alta en los vasos sanguíneos de sus pulmones (hipertensión pulmonar arterial). Reporte si tiene dificultad al respirar, cansancio o hinchazón.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

### (INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que Dasatinib puede permanecer en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Una vez comienza a tomar dasatinib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- ❑ Las mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar contaminada con fluidos corporales del paciente.
- ❑ Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico y/o alcantarillado que normalmente utiliza. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descargue el inodoro dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o la silla del inodoro se contamina con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo utilice.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de utilizar el inodoro.
- ❑ Si usted necesita un orinal para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar el orinal con jabón y agua todos los días.
- ❑ Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una almohadilla desechable con cubierta de plástico, un pañal o papel para absorber cualquier desecho corporal.

# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento.
- La ropa o ropa de cama que haya sido contaminada con fluidos o desechos corporales deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa o ropa de cama que pueda estar contaminada con fluidos corporales.

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman dasatinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y durante un mínimo de 30 días después de la última dosis de dasatinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma dasatinib y por 2 semanas después de la última dosis de dasatinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma dasatinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

Hable con su proveedor de salud sobre el proceso para obtener su [nombre del medicamento]

\_\_\_\_\_ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

### Recursos adicionales

**Página web del producto:** <https://www.sprycel.com>

**Información de prescripción del producto:** [https://packageinserts.bms.com/pi/pi\\_sprycel.pdf](https://packageinserts.bms.com/pi/pi_sprycel.pdf)

**Recursos:** <https://www.sprycel.com/resources>

**Apoyo financiero:** <https://www.sprycel.com/financial-support>

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---



# EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DASATINIB

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permisos:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 por Hematology/Oncology Pharmacy Association. Todos los derechos reservados.