

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ENCORAFENIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — encorafenib (en-koe RAF-e-nib)

Nombre de marca — Braftovi® (braf-TOH-vee)

Usos comunes

Encorafenib se usa para tratar pacientes con cáncer colorrectal metastásico que tiene una variación genética llamada BRAF V600E y se usa en combinación con cetuximab.

Encorafenib también se puede usar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar encorafenib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de encorafenib es 300 miligramos (300 mg) tomados por boca a una hora programada, una vez al día.
- Encorafenib se puede tomar con o sin comida, a la misma hora cada día.
- Encorafenib se debe tomar entero y no triturado, cortado, o disuelto. Si usted no puede tragar su encorafenib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de encorafenib, siga las instrucciones a continuación:
 - Solo tome la dosis omitida si han pasado menos de 12 horas desde que debía tomarla. Luego, tome la próxima dosis a la hora programada regularmente.
 - **No** tome dos dosis a la vez.
 - **Asegúrese** de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

Interacciones con medicamentos y alimentos

- Encorafenib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con encorafenib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

Storage and handling

Maneje encorafenib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde encorafenib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga encorafenib lejos del alcance de niños y mascotas.



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ENCORAFENIB

- ❑ Deje encorafenib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- ❑ Cuando sea posible, administre encorafenib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra encorafenib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera encorafenib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- ❑ El uso de un organizador diario de medicamentos **no** se recomienda para usar con encorafenib.
- ❑ Si le queda encorafenib sin utilizar, **not** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar encorafenib apropiadamente.
- ❑ Si está viajando, coloque el empaque de encorafenib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

Efectos Secundarios de Encorafenib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman encorafenib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario

Manejo

Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)

Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.

- Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.
- Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.
- Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas)
- Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales.
- Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles.
- Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche.
- Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.

Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:

- La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más.
- Se siente mareado o aturdido.

Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



ENCORAFENIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Sarpullido parecido al acné</p>	<p>Un sarpullido que parece acné puede ocurrir en su cara, pecho y espalda alta mientras toma este medicamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su doctor le podrá recetar un medicamento para ayudar a prevenir o manejar el sarpullido. • Si desarrolla este sarpullido, mantenga el área limpia y seca. • Consulte con su proveedor de salud antes de utilizar cualquier remedio. • No utilice medicamentos de venta libre (sin receta médica) para el acné, tales como peróxido de benzoilo (benzoyl peroxide) o ácido salicílico (salicylic acid), ni jabones que contengan alcohol. • Los baños de avena y humectantes sin perfume pueden ayudarle con la picazón. • La luz del sol puede empeorar sus síntomas. • Evite la exposición al sol lo más que pueda para disminuir el riesgo de quemaduras. La exposición mayor a los rayos ultravioletas (UV) ocurre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. • Utilice ropa de mangas largas, con protección contra UV, si es posible. • Utilice gorros o sombreros de ala ancha. • Aplique protector solar de amplio espectro (UVA/UVB) con al menos SPF 30 a menudo, según indicado en el contenedor. • Utilice bálsamo labial con al menos SPF 30.
<p>Dolor abdominal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Usted podría sentir dolor o incomodidad abdominal. Reporte cualquier dolor severo u otros síntomas inmediatamente a su proveedor de salud.
<p>Fatiga</p>	<p>Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita. • Intente realizar actividades físicas todos los días: • Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.
<p>Náuseas o vómitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coma y beba lentamente. • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos. • Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes. • Coma alimentos blandos y evite los alimentos picantes, fritos y grasosos. • Evite el ejercicio vigoroso inmediatamente después de comer. • No se acueste inmediatamente después de comer. • Evite los olores fuertes. <p>Infórmele a su proveedor de salud si siente náuseas o vómitos. Su proveedor de salud puede recetarle medicamentos para ayudar con los síntomas.</p>

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ENCORAFENIB

Possible Efecto Secundario	Manejo
Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none">• Trate de dormir 7-8 horas cada noche.• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.• Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”.• Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite.• Note si se ve más pálido o pálida de lo usual. <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dificultad para respirar• Mareos• Palpitaciones

Efectos secundarios severos de encorafenib

- El desarrollo de cánceres en la piel y otros no cutáneos se ha observado en pacientes que han tomado encorafenib. Se recomienda realizar autoevaluaciones de la piel antes de iniciar el tratamiento con encorafenib, cada 2 meses durante el tratamiento y hasta 6 meses después de terminar su tratamiento con encorafenib.
- Se han reportado hemorragias (sangrado) con encorafenib. Notifique cualquier hemorragia a su proveedor de salud.
- Se han reportado cambios en los ojos, como enrojecimiento, dolor y visión borrosa. Consulte a su proveedor de salud sobre la regularidad con la que debe realizarse un examen de los ojos.
- Los cambios en la actividad eléctrica de su corazón se conocen como prolongación del intervalo QT. Informe inmediatamente a su proveedor de salud si se siente débil, aturdido o mareado, o si nota que su corazón late de forma irregular o rápida, mientras toma encorafenib.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



ENCORAFENIB

Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que encorafenib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento encorafenib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman encorafenib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 2 semanas después de la última dosis de encorafenib.
- Consulte a su proveedor de salud sobre anticoncepción efectiva durante su tratamiento con encorafenib, ya que este medicamento tiene el potencial de reducir la efectividad de los anticonceptivos hormonales.
- No amamante mientras toma encorafenib y por 2 semanas después de la última dosis de encorafenib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma encorafenib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su encorafenib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



ENCORAFENIB

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.braftovihcp.com>

Información de prescripción: <http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=12990>

Recursos del producto: <https://www.braftovihcp.com/access-and-support>

Actualizado – Enero 19, 2023

Instrucciones adicionales

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.