

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



NERATINIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — neratinib (neh-RA-tih-nib)

Nombre de marca — Nerlynx® (NAYR-links)

Usos comunes

Neratinib se usa para tratar a pacientes adultos con cáncer de seno sobreexpresado por el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2).

Neratinib también se puede utilizar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar neratinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de neratinib es 240 miligramos (240 mg) tomados por boca una vez al día. La dosis puede ser ajustada por su proveedor de salud basado en sus necesidades individuales.=
- Neratinib se debe tomar con comida, a la misma hora cada día.
- Neratinib se debe tomar entero y no triturado, cortado, abierto o disuelto. Si no puede tragar neratinib, should be taken whole and not crushed, cut, opened, or dissolved. If you are unable to swallow neratinib, consulte a su médico o farmacéutico sobre posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de neratinib, **no** tome una dosis adicional o dos dosis a la misma vez. Simpleente, tome su próxima dosis a la hora programada regularmente.
- Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

Interacciones con medicamentos y alimentos

- Neratinib tiene el potencial de interactuar con otros medicamentos. has the potential for drug interactions. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- Separe la administración de neratinib y antiácidos por al menos 3 horas; neratinib se puede tomar 2 horas antes o 10 horas después de los bloqueadores de H2, como la famotidina.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con neratinib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- Neratinib se debe tomar con comida.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.



NERATINIB

Almacenamiento y manejo

Maneje neratinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde neratinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga neratinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje neratinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, administre neratinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra neratinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera neratinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si usará un organizador diario o recordatorio para su medicamento, contacte a su equipo de salud antes de usarlo:

La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio).

Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
- Si le queda neratinib sin usar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar neratinib apropiadamente.
- Si está viajando, coloque el envase de neratinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



NERATINIB

Efectos Secundarios de Neratinib

Abajo están los efectos secundarios comunes que han ocurrido en aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman neratinib, al lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario	Manejo
Náuseas o vómitos	<ul style="list-style-type: none">• Coma y beba lentamente.• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.• Coma alimentos blandos y evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.• Evite el ejercicio vigoroso inmediatamente después de comer.• No se acueste inmediatamente después de comer.• Evite los olores fuertes. <p>Infórmele a su proveedor de salud si siente náuseas o vómitos. Su proveedor de salud puede recetarle medicamentos para ayudar con los síntomas.</p>

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



NERATINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</p>	<p>Para la mayoría de los pacientes, se recomienda la prevención de la diarrea tomando un medicamento sin receta (de venta libre) llamado loperamide (Imodium®). Hable con su proveedor de salud sobre esto antes de comenzar a tomar neratinib. El calendario recomendado de loperamide para prevenir la diarrea con neratinib es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neratinib en días 1–14: Tome 4 mg de loperamide tres veces al día por boca. • Neratinib en días 15–56: Tome 4 mg de loperamide dos veces al día por boca. • Después del día 56: Tome 4 mg loperamide según lo necesite, hasta un máximo de 16 mg en 24 horas para tener 1-2 evacuaciones al día. <p>*Hable con su equipo de salud para saber si los siguientes métodos son posibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budesonide 9 mg al día por 1 ciclo con 4 mg loperamide según indicado arriba. • Colestipol 2 mg dos veces al día por 1 ciclo con 4 mg loperamide según sea necesario o: <ul style="list-style-type: none"> • Neratinib en días 1-14: Tome 4 mg de loperamide tres veces al día por boca. • Neratinib en días 15–28: Tome 4 mg de loperamide dos veces al día por boca. <p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos. • Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes. • Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas) • Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales. • Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles. • Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche. • Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos. <p>Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más. • Se siente mareado o aturdido. <p><small>* Hurvitz S, Chan A, Iannotti N, et al. Effects of adding budesonide or colestipol to loperamide prophylaxis on neratinib-associated diarrhea in patients with HER2+ early-stage breast cancer: the CONTROL trial.</small></p>
<p>Dolor abdominal</p>	<p>Usted podría sentir dolor o incomodidad abdominal. Reporte cualquier dolor severo u otros síntomas inmediatamente a su proveedor de salud.</p>

Efectos secundarios severos de neratinib

- ❑ Neratinib podría ser dañino para su hígado. Hable con su proveedor de salud para saber cuándo debe hacerse pruebas de laboratorio para monitorear la función de su hígado. Si usted sufre este efecto secundario, su doctor podría cambiar su dosis o detener el tratamiento por un tiempo.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



NERATINIB

Manejo de fluidos corporales y desechos

Neratinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, por lo que puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar neratinib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento neratinib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman neratinib. Las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 1 mes después de la última dosis de neratinib. Los hombres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 3 meses después de la última dosis de neratinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma neratinib y por 1 mes después de la última dosis de neratinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma neratinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su neratinib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



NERATINIB

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://nerlynx.com>

Información de prescripción del producto: <https://nerlynx.com/pdf/full-prescribing-information.pdf>

Recursos del producto: <https://nerlynx.com/access-and-support>

Actualizado – Diciembre 9, 2022

Instrucciones adicionales

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.