

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



AVAPRITINIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — avapritinib (AY-vah-PRIH-tih-nib)

Nombre de marca — Ayvakit™ (aye-vah-kit)

Usos comunes

Avapritinib se usa para tratar adultos con cierto tipo de cáncer de estómago, intestino o esófago llamado tumor del estroma gastrointestinal (GIST) que no puede tratarse con cirugía o que se ha extendido a otras partes del cuerpo (metástasis) y que es causado por ciertos genes anormales del receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRA). Avapritinib también se utiliza para tratar la mastocitosis sistémica avanzada (AdvSM) y la mastocitosis sistémica indolente (ISM).

Avapritinib también se puede usar para otros tratamientos.

Dosis y administración

Es importante tomar avapritinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de avapritinib es 200 miligramos (200 mg) o 300 miligramos (300 mg) tomados por boca a una programada una vez al día.
- Avapritinib se debe tomar con el estómago vacío, por lo menos una hora antes y dos horas después de una comida.
- Avapritinib se debe tomar entero y no triturado, cortado, o disuelto. Si usted tiene dificultad para tragar avapritinib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para conocer posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de avapritinib, siga estas instrucciones:
 - Tómela tan pronto recuerde, excepto si su próxima dosis programada es dentro de las próximas 8 horas. En este caso, tome la próxima dosis a la siguiente hora programada regularmente.
 - No tome dos dosis a la vez.
 - Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.
 - No repita la dosis si vomita luego de tomar avapritinib, pero continúe con la próxima hora programada regularmente.

Interacciones con medicamentos y alimentos

- Avapritinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- Avapritinib no se debe tomar con comida.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con avapritinib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



AVAPRITINIB

Almacenamiento y manejo

Maneje avapritinib with care. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde avapritinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga avapritinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje avapritinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, administre avapritinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra avapritinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Use guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario usar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera avapritinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si utilizará un organizador diario o recordatorio para su medicamento, contacte a su equipo de salud antes de utilizarlo:
 - La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio).
 - Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
- Si le queda avapritinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar avapritinib apropiadamente.
- Si estará viajando, coloque el envase de avapritinib en un bolso plástico sellado por separado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.
- Se permiten excursiones entre 59°F y 86° F.



AVAPRITINIB

Efectos Secundarios de Avapritinib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman avapritinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurren, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trate de dormir 7-8 horas cada noche. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio. • Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”. • Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite. • Note si se ve más pálido o pálida de lo usual. <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Mareos • Palpitaciones
<p>Retención de fluido o hinchazón</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se mantenga de pie por períodos largos de tiempo. • Mantenga sus piernas elevadas mientras esté sentado o acostado. • Trate de evitar comidas saladas, ya que estas pueden aumentar la hinchazón. • Evite usar ropa apretada y zapatos apretados. • Tome su peso diariamente. <p>Contacte a su proveedor de salud si nota lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hinchazón en las manos, pies, o piernas. • Si siente dificultad al respirar. • Aumento de 5 libras o más en una semana.
<p>Cambios en la función del hígado</p>	<p>La función de su hígado será evaluada periódicamente con una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloración amarillenta de la piel o de los ojos • Orina oscura o marrón • Sangrado o moretones
<p><i>Continúa en la próxima página</i></p>	

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



AVAPRITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Náuseas o vómitos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coma y beba lentamente. • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos. • Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes. • Coma alimentos blandos y evite los alimentos picantes, fritos y grasosos. • Evite el ejercicio vigoroso inmediatamente después de comer. • No se acueste inmediatamente después de comer. • Evite los olores fuertes. <p>Infórmele a su proveedor de salud si siente náuseas o vómitos. Su proveedor de salud puede recetarle medicamentos para ayudar con los síntomas.</p>
<p>Disminución de glóbulos blancos y aumento en el riesgo de infecciones</p>	<p>Sus glóbulos blancos serán monitoreados a través de pruebas simples de sangre. Cuando los glóbulos blancos están bajos, usted tiene un mayor riesgo a desarrollar una infección. Tome las siguientes precauciones para protegerse de una infección:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lave sus manos a menudo, especialmente antes de comer y después de usar el baño. • Evite las multitudes y las personas con fiebre, influenza, u otra infección. • Báñese regularmente para mantener una buena higiene personal. <p>Contacte a su proveedor de salud si presenta alguna señal o síntoma de una infección, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fiebre (temperatura de más de 100.4F o 38C) • Escalofríos • Dolor o molestia en la garganta • Ardor al orinar • Cansancio inusual • Una herida que se enrojece, que está drenando, o que no sana <p>Consulte con su médico antes de tomar un medicamento para la fiebre o escalofríos.</p>
<p>Fatiga</p>	<p>Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita. • Intente realizar actividades físicas todos los días. • Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



AVAPRITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio incluyendo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajo nivel de fosfato • Bajo nivel de potasio • Bajo nivel de magnesio • Bajo nivel de albúmina • Alto nivel de creatinina • alto nivel de bilirrubina • Alto nivel de aspartato aminotransferasa (AST) • Bajo nivel de calcio 	<p>Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio. • Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio. <p>Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Molestias en el pecho • Debilidad o fatiga • Nuevos dolores o molestias • Dolor de cabeza • Mareos • Hinchazón de las piernas o los pies • Orina de color rojo o marrón
<p>Deterioro cognitivo</p>	<p>El deterioro cognitivo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de la memoria • Estado de confusión • Alteración de la atención • Amnesia • Deterioro mental • Cambios en el estado mental • Demencia • Pensamiento anormal • Trastorno mental • Amnesia retrógrada <p>Informe a su proveedor si cree que está experimentando alguno de estos efectos secundarios.</p>
<p>Disminución de apetito o pérdida de peso</p>	<p>Hable con su proveedor de salud si usted nota pérdida de peso mientras toma este medicamento. Cuando no tenga ganas de comer, intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pequeñas comidas frecuentes, en lugar de 3 comidas más grandes cada día. • Tenga meriendas a la mano para comer cuando sienta hambre. • Suplementos nutricionales líquidos. • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, en especial si no está comiendo, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



AVAPRITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</p>	<p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos. • Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes. • Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas) • Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales. • Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles. • Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche. • Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos. <p>Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más. • Se siente mareado o aturdido. <p>Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.</p>
<p>Lagrimeo excesivo</p>	<p>Su proveedor de salud puede referirle a un oftalmólogo para que le evalúe. Asegúrese de informar a su proveedor de salud si experimenta un aumento del lagrimeo u ojos llorosos.</p> <p>Si experimenta un aumento del lagrimeo cuando se expone al sol, utilice gafas de sol cuando salga al exterior.</p>
<p>Dolor abdominal</p>	<p>Usted podría sentir dolor o incomodidad abdominal. Reporte cualquier dolor severo u otros síntomas inmediatamente a su proveedor de salud.</p>
<p>Cambios en la función de los riñones</p>	<p>La función de sus riñones (función renal) será evaluada periódicamente a través de una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la cantidad de orina • Hinchazón inusual de las piernas y los pies
<p>Cambios en el color del cabello</p>	<p>Podrían ocurrir algunos cambios en el color de su cabello durante su tratamiento. Usualmente, el color vuelve a su color normal después del tratamiento; para algunas personas, el cambio es permanente.</p>

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



AVAPRITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado	<p>Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras.• Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz.• Cepille sus dientes con cuidado, con un cepillo suave y mantenga una buena higiene oral.• Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas.• Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas. <p>Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión.• Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión.• Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes. <p>Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable.</p> <p>Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.</p>

Efectos secundarios severos

- ❑ Avapritinib puede causar efectos raros pero severos, incluyendo:
 - Acumulación de líquido entre el pulmón y la cavidad del pecho. Alerta inmediatamente a su equipo de salud si presenta dolor en el pecho de aparición repentina o dificultad para respirar.
 - Mayor riesgo de sangrado en el cerebro. Contacte a su equipo de salud si nota sangrados nasales frecuentes, sangre en las heces, sangrados que ocurren por sí solos sin lesión, o sangrados que no se detienen después de cinco minutos de presión. Deje de tomar avapritinib e informe a su equipo de salud si desarrolla algún síntoma como dolor de cabeza intenso, problemas de visión, somnolencia intensa o debilidad intensa en un lado del cuerpo.
 - Avapritinib puede causar defectos de nacimiento graves. No tome avapritinib si está embarazada o cree que podría estarlo.
 - Mientras toma avapritinib su piel puede ser más sensible al sol. Utilice protector solar o ropa protectora cuando esté al sol, incluso en días nublados, y evite las cabinas de bronceado. Hable con su equipo de salud sobre otras formas de prevenir o controlar este efecto secundario.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



AVAPRITINIB

Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que avapritinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman avapritinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 6 semanas después de la última dosis de avapritinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma avapritinib y por 2 semanas después de la última dosis de avapritinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma avapritinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su avapritinib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



AVAPRITINIB

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.ayvakit.com>

Información de prescripción del producto: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/212608s007lbl.pdf

Recursos del producto: <https://www.yourblueprint.com>

Actualizado – Mayo 31, 2023

Instrucciones adicionales

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.