

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DACOMITINIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — Dacomitinib

Nombre de marca — Vizimpro® (vih-ZIM-pro)

### Usos comunes

Dacomitinib se usa para tratar cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC) que tiene una variante genética llamada factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

Dacomitinib también se puede usar para otros tratamientos.

### Dosis y administración

Es importante tomar dacomitinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de dacomitinib es 45 miligramos (45 mg) tomados por boca, a una hora programada una vez al día.
- Dacomitinib se puede tomar con o sin comida, a la misma hora cada día.
- Dacomitinib se debe tomar entero y no triturado, cortado, o disuelto. Si usted no puede tragar su dacomitinib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para posibles opciones.
- Si olvida una dosis de dacomitinib, **no** tome una dosis adicional o dos dosis a la vez. Simplemente, tome su próxima dosis a la siguiente hora programada. Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

### Interacciones con medicamentos y alimentos

- Dacomitinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- Este medicamento no se debe tomar con ningún tipo de medicamento para reducir la acidez llamado inhibidor de la bomba de protones.
- Si toma un antiácido o un bloqueador de H2 durante el tratamiento, tome su dosis de dacomitinib al menos 6 horas antes o 10 horas después de tomar el medicamento antiácido o bloqueador H2.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

### Almacenamiento y manejo

Maneje dacomitinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde dacomitinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DACOMITINIB

- ❑ Mantenga dacomitinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- ❑ Mantenga dacomitinib en su empaque original, hasta que esté listo para tomarlo.
- ❑ Cuando sea posible, administre dacomitinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra dacomitinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
  1. Lávese las manos con jabón y agua.
  2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera dacomitinib de su empaque original a un vasito pequeño de medicina u otro desechable.
  4. Administre el medicamento inmediatamente con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
  6. Tire los guantes y el vasito de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- ❑ Si usted utilizará un contenedor de medicamentos diario o recordatorio, contacte a su equipo de salud antes de utilizarlo:
  - La persona que llenará el contenedor diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el contenedor o recordatorio).
  - Cuando esté vacío, el contenedor diario debe lavarse con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el contenedor, aunque haya utilizado guantes.
- ❑ Si le queda dacomitinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar dacomitinib apropiadamente.
- ❑ Si está viajando, coloque su dacomitinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## DACOMITINIB

### Efectos Secundarios de Dacomitinib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman dacomitinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</b></p>	<p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li> <li>• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.</li> <li>• Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas)</li> <li>• Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales.</li> <li>• Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles.</li> <li>• Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche.</li> <li>• Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li> </ul> <p>Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más.</li> <li>• Se siente mareado o aturdido.</li> </ul> <p>Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.</p>
<p><b>Sarpullido parecido al acné</b></p>	<p>Un sarpullido que parece acné puede ocurrir en su cara, pecho y espalda alta mientras toma este medicamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Su doctor le podrá recetar un medicamento para ayudar a prevenir o manejar el sarpullido.</li> <li>• Si desarrolla este sarpullido, mantenga el área limpia y seca.</li> <li>• Consulte con su proveedor de salud antes de utilizar cualquier remedio.</li> <li>• No utilice medicamentos de venta libre (sin receta médica) para el acné, tales como peróxido de benzoilo (benzoyl peroxide) o ácido salicílico (salicylic acid), ni jabones que contengan alcohol.</li> <li>• Los baños de avena y humectantes sin perfume pueden ayudarle con la picazón.</li> <li>• La luz del sol puede empeorar sus síntomas.             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Evite la exposición al sol lo más que pueda para disminuir el riesgo de quemaduras. La exposición mayor a los rayos ultravioletas (UV) ocurre entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.</li> <li><input type="checkbox"/> Utilice ropa de mangas largas, con protección contra UV, si es posible.</li> <li><input type="checkbox"/> Utilice gorros o sombreros de ala ancha.</li> <li><input type="checkbox"/> Aplique protector solar de amplio espectro (UVA/UVB) con al menos SPF 30 a menudo, según indicado en el contenedor.</li> <li><input type="checkbox"/> Utilice bálsamo labial con al menos SPF 30.</li> </ul> </li> </ul>

Continúa en la próxima página

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## DACOMITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Cambios en las uñas</b></p>	<p>Usualmente, este cambio comienza en la cutícula y puede afectar la piel alrededor de la uña.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Morder, masticar o hurgarse las uñas pueden aumentar el riesgo de contraer una infección.</li> <li>• Hable con su proveedor de salud si nota cualquier cambio en sus uñas.</li> </ul>
<p><b>Irritación o llagas en la boca</b></p>	<p>Practique buen cuidado de su boca.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enjuague su boca frecuentemente.</li> <li>• Cepille sus dientes con un cepillo suave o con un bastoncillo de algodón después de comer.</li> <li>• Utilice un enjuagador bucal suave, sin alcohol, al menos 4 veces al día (después de comer y a la hora de dormir). Por ejemplo, puede mezclar 1/8 de una cucharadita de sal con 1/4 de una cucharadita de bicarbonato en 8 onzas de agua templada (no caliente).</li> <li>• Si tiene llagas en su boca, evite usar productos de tabaco, alcohol y enjuagadores bucales que contengan alcohol.</li> </ul> <p>Llame a su proveedor de salud si siente dolor o si nota llagas en su boca o garganta.</p>
<p><b>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</b></p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trate de dormir 7-8 horas cada noche.</li> <li>• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.</li> <li>• Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”.</li> <li>• Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite.</li> <li>• Note si se ve más pálido o pálida de lo usual.</li> </ul> <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Mareos</li> <li>• Palpitaciones</li> </ul>
<p><b>Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo nivel de albúmina</li> <li>• Bajo nivel de calcio</li> <li>• Alto nivel de glucosa</li> <li>• Baja cantidad de linfocitos</li> </ul>	<p>Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio.</li> <li>• Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio.</li> </ul> <p>Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Molestias en el pecho</li> <li>• Debilidad o fatiga</li> <li>• Nuevos dolores o molestias</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Mareos</li> <li>• Hinchazón de las piernas o los pies</li> <li>• Orina de color rojo o marrón</li> </ul>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DACOMITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Cambios en la función del hígado</b>	<p>La función de su hígado será evaluada periódicamente con una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coloración amarillenta de la piel o de los ojos</li><li>• Orina oscura o marrón</li><li>• Sangrado o moretones inusuales</li></ul>
<b>Disminución de apetito o pérdida de peso</b>	<p>Hable con su proveedor de salud si usted nota pérdida de peso mientras toma este medicamento. Cuando no tenga ganas de comer, intente lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pequeñas comidas frecuentes, en lugar de 3 comidas más grandes cada día.</li><li>• Tenga meriendas a la mano para comer cuando sienta hambre.</li><li>• Suplementos nutricionales líquidos.</li><li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, en especial si no está comiendo, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li></ul>

### Serious side effects of dacomitinib

- Dacomitinib puede causar cicatrización en el tejido pulmonar, lo que se conoce como enfermedad pulmonar intersticial. Llame a su equipo médico si siente que le falta el aire, tiene fiebre, o tiene una tos seca persistente.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

### (INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que dacomitinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento encorafenib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DACOMITINIB

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Dacomitinib puede causar defectos de nacimiento graves. Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman dacomitinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y durante un mínimo de 17 días después de la última dosis de dacomitinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma dacomitinib y por 17 días después de la última dosis de dacomitinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma dacomitinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su dacomitinib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

### Recursos adicionales

**Página web del producto:** [www.vizimpro.com](http://www.vizimpro.com)

**Información de prescripción del producto:** <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=11019>

**Recursos del producto:** [www.vizimpro.com/support-resources#financial-assistance](http://www.vizimpro.com/support-resources#financial-assistance)

**Actualizado – Febrero 14, 2023**

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## DACOMITINIB

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permiso:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.