

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## PACRITINIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — pacritinib (pak-RIH-tih-nib)

Nombre de marca — Vonjo™ (VON-joh)

### Usos comunes

Pacritinib se usa para tratar a pacientes con mielofibrosis.

Pacritinib también se puede usar para otros tratamientos.

### Dosis y administración

Es importante tomar pacritinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de pacritinib es 200 miligramos (200 mg) tomados por boca a una hora programada, dos veces al día.
- Pacritinib se puede tomar con o sin comida, pero a la misma hora todos los días.
- Pacritinib se debe tomar entero y no triturado, cortado ni disuelto. Si tiene dificultad para tragar pacritinib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico(a) para conocer posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de pacritinib **no** tome una dosis adicional o dos dosis al mismo tiempo. Simplemente tome su próxima dosis a la hora programada regularmente. Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

### Interacciones con medicamentos y alimentos

- Pacritinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas, y productos herbales.
- La toronja o el jugo de toronja pueden interactuar con pacritinib; evite comerlo o tomarlo durante su tratamiento con pacritinib
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos, suplementos, o recibir cualquier vacuna.

### Almacenamiento y manejo

Maneje pacritinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde pacritinib a temperatura ambiente (68° - 77° F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga pacritinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje pacritinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, adminístrese pacritinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra pacritinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## PACRITINIB

1. Lávese las manos con jabón y agua.
  2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera pacritinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
  4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
  6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- No se recomienda el uso de un organizador diario o un recordatorio de medicamentos con pacritinib.
  - Si le queda pacritinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar pacritinib apropiadamente.
  - Si está viajando, coloque el envase de pacritinib en un bolso plástico separado y sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

### Efectos Secundarios de Pacritinib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman pacritinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</b>	<p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li><li>• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.</li><li>• Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas)</li><li>• Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales.</li><li>• Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles.</li><li>• Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche.</li><li>• Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li></ul> <p>Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más.</li><li>• Se siente mareado o aturdido.</li></ul> <p>Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.</p>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## PACRITINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado</b></p>	<p>Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras.</li> <li>• Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz.</li> <li>• Cepille sus dientes con cuidado, con un cepillo suave y mantenga una buena higiene oral.</li> <li>• Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas.</li> <li>• Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas.</li> </ul> <p>Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes.</li> </ul> <p>Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable.</p> <p><b>Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.</b></p>
<p><b>Náuseas</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coma y beba lentamente.</li> <li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li> <li>• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.</li> <li>• Coma alimentos blandos y evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li> <li>• Evite el ejercicio vigoroso inmediatamente después de comer.</li> <li>• No se acueste inmediatamente después de comer.</li> <li>• Evite los olores fuertes.</li> </ul> <p>Infórmele a su proveedor de salud si siente náuseas o vómitos. Su proveedor de salud puede recetarle medicamentos para ayudar con los síntomas.</p>

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## PACRITINIB

### Efectos secundarios severos

- ❑ Pacritinib puede causar una condición llamada prolongación QT o QTc que es un ritmo cardíaco que puede causar latidos del corazón rápidos e irregulares. Estos latidos rápidos pueden provocar desmayos o convulsiones. En raras ocasiones, esto puede poner en peligro su vida. Informe inmediatamente a su equipo de atención si se siente débil, aturdido, mareado o si nota que su corazón late de forma irregular o rápida mientras toma pacritinib.
- ❑ Usted puede correr el riesgo de desarrollar una infección grave durante su tratamiento. Informe a su proveedor si tiene síntomas de infección, incluyendo fiebre, escalofríos y dolores. Si interrumpe el tratamiento con pacritinib y sus síntomas empeoran, informe a su proveedor de salud.
- ❑ Tromboembolismo venoso: Pacritinib puede aumentar el riesgo de sufrir un coágulo de sangre. Busque atención médica inmediata si presenta hinchazón repentina en un brazo o una pierna, si tiene dolor en el pecho o dificultad para respirar.
- ❑ Tumor maligno secundario: Existe un pequeño riesgo de desarrollar un segundo cáncer años o meses después de tomar pacritinib. Hable con su proveedor de salud sobre este riesgo.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

### (INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que pacritinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomarlo, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- ❑ Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- ❑ Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces, o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- ❑ Si usted necesita una bacinilla par la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- ❑ Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- ❑ Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento pacritinib.
- ❑ La ropa, sábanas, o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- ❑ Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas, o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## PACRITINIB

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman pacritinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 1 mes después de la última dosis de pacritinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma pacritinib y por 2 semanas después de la última dosis de pacritinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma pacritinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre el proceso para obtener su pacritinib.

\_\_\_\_\_ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

### Recursos adicionales

**Página web del producto:** [www.vonjo.com/hcp](http://www.vonjo.com/hcp)

**Información de prescripción del producto:** [www.ctibiopharma.com/VONJO\\_USPI.pdf](http://www.ctibiopharma.com/VONJO_USPI.pdf)

**Recursos del producto:** [www.vonjo.com/hcp/support](http://www.vonjo.com/hcp/support)

**Actualizado – Junio 2, 2022**

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## PACRITINIB

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permiso:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.