

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## RIPRETINIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — ripretinib (rih-PREH-tih-nib)

Nombre de marca — Qinlock® (KIN-lok)

### Usos comunes

Ripretinib se usa para el tratamiento de pacientes adultos con tumor del estroma gastrointestinal (GIST) avanzado que han recibido tratamiento previo con 3 o más inhibidores de la cinasa, incluyendo imatinib.

Ripretinib también se puede usar para otros tratamientos.

### Dosis y administración

Es importante tomar ripretinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis habitual de ripretinib es de 150 miligramos (150 mg) para tomar por boca a la misma hora programada una vez al día.
- Ripretinib puede tomarse con o sin comida, pero a la misma hora todos los días.
- Ripretinib debe tomarse entero y no triturado, cortado, o disuelto. Si no puede tragar ripretinib, hable con su médico o farmacéutico(a) para conocer otras opciones.
- Si olvida tomar una dosis de ripretinib:
  - Solo tome la dosis olvidada si han pasado menos de 8 horas desde que se suponía que debía tomarla. Luego, tome la siguiente dosis a la hora programada regularmente.
  - No tome dos dosis a la vez.
  - Asegúrese de anotar si olvida una dosis e infórmele a su proveedor de salud sobre cualquier dosis olvidada.

### Interacciones con medicamentos y alimentos

- Ripretinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas, y productos herbales.
- La toronja o el jugo de toronja pueden interactuar con ripretinib; Evite comer o beber toronja durante el tratamiento con ripretinib.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos, suplementos, o recibir cualquier vacuna.

### Almacenamiento y manejo

Maneje ripretinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde ripretinib a temperatura ambiente (68°F – 77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## RIPRETINIB

- ❑ Ripretinib incluye un paquete desecante en el envase para proteger su medicamento de la humedad. No retire el paquete desecante del envase.
- ❑ Mantenga ripretinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- ❑ Deje ripretinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- ❑ Cuando sea posible, administre ripretinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo, o cuidador le administra ripretinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
  1. Lávese las manos con jabón y agua.
  2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera ripretinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
  4. Adminístrese el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
  6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- ❑ No se recomienda el uso de un organizador diario o recordatorio de medicamentos para ripretinib
- ❑ Si le queda ripretinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar ripretinib apropiadamente.
- ❑ Si está viajando, coloque el envase de ripretinib en un bolso plástico sellado por separado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

### Efectos Secundarios de Ripretinib

Los efectos secundarios comunes que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman ripretinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Pérdida de cabello (alopecia)</b>	<p>Su cabello volverá a crecer cuando termine su tratamiento.</p> <p>Algunas personas deciden utilizar bufandas, gorros o pelucas. Cortarse el cabello antes de comenzar el tratamiento podría ayudarle a manejar el estrés de la pérdida del cabello.</p>
<b>Fatiga</b>	<p>Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita.</li><li>• Intente realizar actividades físicas todos los días.</li><li>• Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías.</li><li>• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.</li></ul>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## RIPRETINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Náuseas o vómitos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coma y beba lentamente.</li><li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li><li>• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.</li><li>• Coma alimentos blandos y evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li><li>• Evite el ejercicio vigoroso inmediatamente después de comer.</li><li>• No se acueste inmediatamente después de comer.</li><li>• Evite los olores fuertes.</li></ul> <p>Infórmele a su proveedor de salud si siente náuseas o vómitos. Su proveedor de salud puede recetarle medicamentos para ayudar con los síntomas.</p>
<b>Dolor abdominal</b>	<p>Usted podría sentir dolor o incomodidad abdominal. Reporte cualquier dolor severo u otros síntomas inmediatamente a su proveedor de salud.</p>
<b>Aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT) y/o del índice internacional normalizado (INR), que miden el tiempo que tarda la sangre en coagularse</b>	<p>La sangre puede tardar más en coagularse, lo que significa que es más fácil que le salgan hematomas o que sangre. Informe a su médico de cualquier hematoma o sangrado inusual.</p>
<b>Estreñimiento</b>	<p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li><li>• Manténgase activo o activa y haga ejercicios, si es posible.</li><li>• Coma alimentos altos en fibra, como frutas y vegetales crudos.</li></ul> <p>Contacte a su médico si no ha tenido una evacuación en 3 días o más. Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica) para ayudar con el estreñimiento. Un ablandador de heces diario como docusato (Colace®) y/o un laxante como senna (Senokot®) le podría ayudar. Si esto no le ayuda dentro de las 48 horas, informe a su médico.</p>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## RIPRETINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<b>Dolor muscular o en las articulaciones, o debilidad</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga un diario de su dolor, incluyendo una descripción de cuándo y dónde ocurre el dolor, cómo se siente y cuánto tiempo dura.</li><li>• Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse de ser necesario.</li><li>• Dígale a su proveedor de salud si el dolor le interrumpe sus actividades diarias.</li></ul> Si el dolor o la debilidad le molesta, pregunte a su proveedor de salud qué puede usar para ayudar con la molestia. Solamente tome medicamentos para el dolor que sean recetados o recomendados por su proveedor de salud.
<b>Aumento de la lipasa sérica, una enzima producida por el páncreas</b>	Informe a su médico si experimenta náuseas y/o vómitos con dolor abdominal durante su tratamiento, ya que podrían ser signos de cambios en la función del páncreas.
<b>Dolor o incomodidad en las manos y/o pies</b>	El síndrome de mano y pie (HFS) es una reacción en la piel que aparece en la palma de las manos y en la planta de los pies. Puede verse como un sarpullido, descamación de la piel, o sentirse como “hormigueo”. Notifíquelo a su proveedor de salud inmediatamente si usted siente este efecto secundario.  Para prevenir HFS, usted puede: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantener sus manos y pies humectados.</li><li>• Evitar duchas o baños calientes que podrían reseca su piel.</li><li>• Evitar utilizar zapatos apretados o medias apretadas.</li></ul>

### Efectos secundarios severos

- Ripretinib puede causar nuevos cánceres de piel primarios. Notifique a su equipo de salud si nota algún cambio en su piel o nuevas lesiones en la piel.
- Ripretinib puede causar aumento de la presión sanguínea. Informe a su equipo de salud si presenta síntomas como dolor de cabeza, mareos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, o retención de líquidos/aumento de peso/hinchazón.
- Ripretinib puede causar una disminución de la función cardíaca o cardiomiopatía. Informe a su equipo de salud si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho.
- Ripretinib puede causar problemas de cicatrización de heridas. Notifique a su equipo de salud si tiene una herida que no sana adecuadamente. También informe a su equipo de salud si tiene una cirugía o un procedimiento dental planificado, ya que se debe suspender ripretinib antes de su cirugía.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

**(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)**

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## RIPRETINIB

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que ripretinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar ripretinib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal, o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento ripretinib.
- La ropa, sábanas, o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas, o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman ripretinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 1 semana después de la última dosis de ripretinib.
- Anticoncepción efectiva puede incluir 1 o más de los siguientes: anticonceptivos orales, métodos de barrera, etc.
- No amamante mientras toma ripretinib y por 1 semana después de la última dosis de ripretinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma ripretinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su ripretinib.

(INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## RIPRETINIB

### Recursos adicionales

**Página web del producto:** <https://www.qinlock.com/>

**Información de prescripción:** <https://www.qinlockhcp.com/Content/files/qinlock-prescribing-information.pdf>

**Recursos del producto:** <https://www.deciphraaccesspoint.com>

**Actualizado – Marzo 17, 2023**

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permiso:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.